



open: resterende inleidingen exclusief
uterus, stuitligging en SROM.

Tijdsduur tot vaginale
(uur)

Modus partus

Spontaan

Vacuüm

Sectio

Reden vacuüm

Niet vorderen barin

Foetale nood

Overig

Reden sectio

Niet vorderen barin

Mislukte inleiding

Foetale nood

≤3cm ontsluiting

Oxytocinetoediening

Hyperstimulatie

met CTG-afwijkinge

zonder CTG afwijki

Pijnstilling

Pethidine

Epidurale anesthesi

Data worden weer

‡Mann-Whitn

* Fisher's exa

Perinatale uitkomsten

	Foleycatheter n=109	Prostaglandine E2 n=109	RR (95%CI)	p-waarde
Geboortegewicht (gram)	2983 (±575)	3040 (±568)	-	0.472‡
Gewicht <P10	54 (50%)	43 (39%)	1.25 (0.93-1.70)	0.134
MHVW	15 (14%)	19 (17%)	0.79 (0.42-1.47)	0.455
MBO afgenomen	21 (19%)	17 (16%)	1.23 (0.69-2.21)	0.475
pH in MBO ≤7.20 of significant STAN event	10 (9%)	1 (1%)	10.0 (1.30-76,79)	0.005
AS <7 na 5 minuten	4 (4%)	3 (3%)	1.33 (0.31-5.82)	1.000*
pH navelstrenarterie ¹				
pH ≤ 7.20	40(38%)	38 (36%)	1.05 (0.74-1.50)	0.775
pH ≤7.10	9 (9%)	8 (8%)	1.14 (0.46-2.83)	0.794