

# Intro interview Eileen Hutton

Suze Jans

**Op 14 oktober jl. verscheen in Medisch Contact het nevenstaande interview met Eileen Hutton, hoogleraar Midwifery Science van AVAG/ VUmc. Zoals u misschien al wel eerder heeft opgemerkt, neemt het Tijdschrift voor Verloskundigen wel vaker een artikel integraal over uit een ander tijdschrift. De redactie meent dan dat het van belang is dat verloskundigen op de hoogte zijn van de betreffende publicatie. Het is goed dat u weet wat er in andere media over de verloskunde wordt geschreven. Het kan gaan om uitkomsten van onderzoek, maar ook om een tekst die beleidsmatig van belang is of, zoals in dit geval, een interview.**

Het interview met Hutton geeft een wat genuanceerder geluid ten aanzien van de discussie over de perinatale sterfte in Nederland en de vergaande gevolgen die dit lijkt te gaan hebben voor de organisatie van verloskundige zorg in ons land.

In een Utrechts onderzoek was de neonatale sterfte hoger bij bevallingen die zijn gestart bij de verloskundige (Evers et al 2010). Ander onderzoek laat zien dat het hoogste sterfterisico zit in de groep die tijdens de baring is overgedragen en onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog bevalt (Ravelli et al 2008). Mogelijk ligt de oorzaak van verhoogde sterfte vooral bij de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Een onderzoeksgroep gevormd door onderzoekers van het AMC, Midwifery Science VUmc en Maastricht UMC, in samenwerking met regionale zorgverleners, voert momenteel een vergelijkbare studie uit in de regio Amsterdam. Bij het opzetten van het onderzoek bleek dat het ingewikkeld is om te zorgen dat de teller en noemer bij het vergelijken van sterftecijfers uit dezelfde groep komen. Het beschrijven van definities, zoals aangeven of de baring in de eerste- of tweedelij is begonnen, is niet eenvoudig. Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met het trekken van steekproeven om te kijken hoe vaak bijvoorbeeld de definitie 'start baring' klopt met dat wat er in het dossier staat van de client.

Marianne Amelink noemde onlangs in het NRC dat echt inzicht in oorzaken van de relatief slechte sterftecijfers in Nederland, alleen maar kan ontstaan door de sterftege-

vallen stuk voor stuk te analyseren (NRC 110925). Dit deden Mariet van van Diem en haar collega's. In een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over de perinatale audits in Noord-Nederland schreven zij dat de geïdentificeerde substandaard zorgfactoren vooral te maken hadden met het afwijken van protocollen, onvoldoende communicatie en onvoldoende documentatie (van Diem et al NtvG 2011).

Ook Evers en Kwee beschreven substandaard zorg in gevallen van antepartum sterfte in een vervolgstudie in de regio Utrecht die aanzienlijk minder aandacht kreeg dan hun voorgaande publicatie. Substandaard zorg werd geïdentificeerd in 10 van de 46 gevallen (21,7 %) in de eerstelij en in 14 van de 22 gevallen (63,6%) in de tweedelij. Substandaard zorg trad met name op bij groeivertraging en hypertensie (Evers et al 2011).

De KNOV rondt op dit moment de standaard hypertensie af en ontwikkelt een standaard groeivertraging. Te verwachten is dat de zorg met behulp van deze twee standaarden zal verbeteren en daarmee ook van invloed zal zijn op de zwangerschapsuitkomsten. ■

## Meer informatie en referenties

Een eerder interview met Eileen Hutton verscheen in dit Tijdschrift: TvV 2010; 09 37-39  
De resultaten van het onderzoek naar waterinjecties werden in 2009 in dit tijdschrift besproken: Boer, J de, Aitink, M. Steriele waterinjecties; een effectieve en veilige pijnbehandeling voor vrouwen tijdens de baring. TvV 2009;09:12-15

Evers AC, Brouwers HA, Hukkelhoven CW, Nikkels PG, Boon J, van Egmond-Linden A, Hillegersberg J, Snuif YS, Sterken-Hooisma S, Bruinse HW, Kwee A. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. *BMJ*. 2010 Nov 2;341:c5639.

Evers AC, Nikkels PG, Brouwers HA, Boon J, van Egmond-Linden A, Hart C, Snuif YS, Sterken-Hooisma S, Bruinse HW, Kwee A. Substandard care in antepartum term stillbirths: prospective cohort study. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2011 Jul 28

Kohler W. Als een baby rond de geboorte overlijdt. *NRC/Weekendbijlage* 24 september 2011.

Ravelli A.J., Eskes M, Tromp M, van Huis AM, Steeger EAP, Tamminga P en Bonsel GJ. Perinatale sterfte in Nederland gedurende 2000-2006; risicofactoren en Risicoselectie. *NTvG*. 2008 Dec 13;152(50):2728-33

van Diem MT, Bergman KA, Bouman K, van Egmond N, Stant DA, Timmer A, Ulkeman LH, Veen WB, Erwich JJ. Perinatale audit in Noord Nederland: de eerste twee jaar. *NTvG*. 2011;155(18):A2892.